



**MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
RETE ILVA**

REPORT SETTEMBRE 2013

CENTRO REGIONALE ARIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

www.arpa.puglia.it

Questo report riporta i dati medi giornalieri registrati nel mese di SETTEMBRE 2013 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA. La prescrizione 85 del Decreto di Riesame dell'AIA rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedeva che la Ditta installasse 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento. Le 6 stazioni sono state installate ed entrate in funzione nel mese di agosto 2013. Durante il primo mese di funzionamento sono state effettuate le attività di start-up della rete e del sistema di gestione dati. Le caratteristiche delle stazioni sono riportate di seguito, mentre in figura 1 è mostrata la loro collocazione. Delle 6 stazioni, 4 si trovano lungo il perimetro dello stabilimento, una nell'area cokeria e una in via Orsini, nel quartiere Tamburi.

Nome stazione	INQUINANTI MONITORATI
COKERIA	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
DIREZIONE	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
RIV	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
PARCHI	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC, SO2, NO2, CO
PORTINERIA	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
TAMBURI	H2S, IPAtot, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC



Fig.1 Dislocazione delle centraline di monitoraggio

I limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 non sono normativamente applicabili alle stazioni della rete ILVA interne agli ambienti di lavoro (Cokeria, Direzione, Riv, Parchi e Portineria) che ricadono in aree industriali private, non accessibili alla popolazione; i livelli misurati si confrontano, ugualmente, con i valori limite di legge, per fini comparativi. mentre tali limiti si applicano alla stazione denominata Tamburi.

Non si riportano i dati di VOC, in ragione della difficoltà di rappresentazione grafica della mole di dati prodotti dagli strumenti installati nella rete; tali dati saranno oggetto di successive elaborazioni.

H₂S

Nel mese di settembre 2013 le concentrazioni medie giornaliere si sono mantenute sotto i 10 µg/m³ in tutti i siti di monitoraggio, ad eccezione del sito *cokeria* nel quale sono state registrate concentrazioni più elevate, con livelli che in alcuni giorni hanno superato i 50 µg/m³.




Fig.1 Livelli di concentrazione di H₂S

H ₂ S (µg/m ³)	set-13
TAMBURI	1.9
Portineria	1.1
Cokeria	23
RIV1	3.5
Meteo parchi	1.6
Direzione	3.6

PM10

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE GIORNALIERO	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare per più di 35 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

In ogni stazione di monitoraggio sono installati 2 monitor di PM10, un FAI SWAM 5a che fornisce una concentrazione media giornaliera ed un ENVIRONNEMENT MP101M che fornisce invece dati biorari; quest'ultimo analizzatore consente di valutare gli andamenti del PM10 nel corso delle 24 ore.

SWAM 5a

Le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *cokeria*, le più basse in quello denominato *portineria*.




Fig.2 Livelli di concentrazione di PM10 (SWAM)

Nel sito Tamburi non si sono registrati nel mese di settembre superamenti del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (da non oltrepassare più di 35 volte nel corso dell'anno).

Si riportano di seguito le correlazioni tra le concentrazioni giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. La mancanza di correlazione appare coerente con la natura industriale dei siti di monitoraggio. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile sono *Direzione* e *Portineria*, stazioni collocate al perimetro dello stabilimento, *Tamburi* e *Meteo parchi*, *Portineria* e *Riv1*.

CORRELAZIONI SETTEMBRE 2013						
	Tamburi	portineria	cokeria	riv1	meteo parchi	direzione
Tamburi	1.00	-0.10	0.20	0.21	0.73	-0.05
portineria		1.00	-0.15	0.74	-0.04	0.85
cokeria			1.00	-0.07	0.59	-0.06
riv1				1.00	0.19	0.58
meteo parchi					1.00	-0.08
direzione						1.00

ENVIRONNEMENT MP101M

Data la più breve scansione temporale, con tale strumento è possibile costruire l'andamento del giorno "tipo" delle concentrazioni di PM10 in ogni sito.




Fig.3 Giorno tipo delle concentrazioni di PM10

PM2.5

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE OBIETTIVO	25 µg/m ³	D. Lgs. 155/10

Come per il PM10, anche per il PM2.5 le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *cokeria*, mentre le altre stazioni registrano concentrazioni fra loro paragonabili.




Fig.4 Livelli di concentrazione diPM2.5

PM2.5 (µg/m ³)	set-13
TAMBURI	12
Portineria	10
Cokeria	39
RIV1	11
Meteo parchi	14
Direzione	15

Si riportano di seguito le correlazioni tra le concentrazioni medie giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. Anche per il PM2.5 si osserva la mancanza di correlazione tra i siti di monitoraggio, e le uniche stazioni che mostrano una correlazione accettabile sono *Direzione* e *Portineria*, *Cokeria* e *Meteo parchi*, *Portineria* e *Riv1*.

CORRELAZIONI SETTEMBRE 2013						
	Tamburi	portineria	cokeria	riv1	meteo parchi	direzione
Tamburi	1.00	0.74	0.01	0.70	0.30	0.56
portineria		1.00	-0.21	0.79	0.15	0.83
cokeria			1.00	-0.16	0.80	0.08
riv1				1.00	0.18	0.62
meteo parchi					1.00	0.27
direzione						1.00

Benzene

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ANNUALE	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	D. Lgs 155/10

Nel mese di settembre 2013 le concentrazioni più elevate si sono registrate nel sito *cokeria*, con livelli medi giornalieri superiori anche a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e una media mensile di 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Negli altri siti le concentrazioni si sono medie mensili si sono mantenute sotto il valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite medio annuale)




Fig.5 Livelli di concentrazione di benzene

Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	set-13
Tamburi	1.2
Portineria	0.4
Cokeria	33
RIV1	0.5
Meteo parchi	1.2
Direzione	2.6

Black Carbon

Il Black Carbon (BC) si forma in seguito a combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa; può essere emesso da sorgenti naturali ed antropiche sotto forma di fuliggine. Il parametro relativo al BC totale in aria ambiente non è normato. Lo strumento installato nelle stazioni di monitoraggio della

rete ILVA sfrutta il principio dell'assorbimento della radiazione luminosa da parte del BC a determinate lunghezze d'onda.

Le concentrazioni medie mensili più alte nel mese di settembre 2013 sono state registrate nella stazione *Tamburi*. Questo dato richiede approfondimenti, che saranno svolti nei mesi successivi.




Fig.6 Livelli di concentrazione di Black Carbon

Black carbon (ng/m ³)	set-13
TAMBURI	1704
Portineria	952
Cokeria	1647
RIV1	999
Meteo parchi	1487
Direzione	1510

IPA Totali

I valori di IPA totali presenti in aria ambiente sono rilevati con il Monitor ECOCHEM mod. PAS 2000 che utilizza il metodo della fotoionizzazione selettiva degli IPA totali, adsorbiti sulle superfici degli aerosol carboniosi aventi diametro aerodinamico compreso tra 0.01 e 1.5 µm. Il parametro relativo agli IPA totali in aria ambiente non è normato: il D. Lgs. 155/10 si riferisce unicamente al Benzo(a)Pirene adsorbito sulla frazione di particolato PM10, indicando un valore obiettivo annuale da non superare. Tali misure, pertanto, sono da considerarsi puramente indicative.

I livelli più alti di IPA nel mese di settembre si sono registrati nella stazione *cokeria*, con una media mensile di 35 ng/m³, i valori più bassi a *Portineria*.




Fig.7 Livelli di concentrazione di Ipatot

IPA tot (ng/m ³)	Conc.
TAMBURI	22
Portineria	8
Cokeria	35
RIV1	16
Meteo parchi	15
Direzione	18

SO₂, NO₂ e CO

LIMITI VIGENTI NO ₂	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ORARIO PER L'ANNO 2014	200 µg/m³ , da non superare per più di 18 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE PER L'ANNO 2014	40 µg/m³	
SOGLIA DI ALLARME	400 µg/m³ da misurarsi su 3 ore consecutive	

Questi inquinanti sono monitorati unicamente nella stazione *Parchi*. Per nessuno di essi si sono registrate concentrazioni particolarmente elevate.

È opportuno evidenziare che la stazione in oggetto si trova ad un'altezza di circa 15 metri dal suolo. Questa collocazione può verosimilmente portare alla registrazione di concentrazioni più basse di quelle registrate al suolo, a causa di fenomeni di diluizione degli inquinanti emessi dagli impianti dello stabilimento ILVA.




Fig.8 Livelli di concentrazione di SO₂




Fig.9 Livelli di concentrazione di NO₂




Fig.10 Livelli di concentrazione di CO

PERCENTUALE DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la percentuale di dati validi prodotti dagli analizzatori nel mese in esame.

	Acido Solfidrico (H2S)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	PM10	PM10 (analizzatore ENV con dati biorari)	PM2.5	Benzene	Black carbon	Biossido di Zolfo (SO2)	Biossido di azoto (NO2)	Monossido di Carbonio (CO)
	ug/m3 293K	ng/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3 293K		ug/m3 293K	ug/m3 293K	mg/m3 293K
COKERIA	88	89	90	90	90	80	88	/	/	/
DIREZIONE	98	100	100	100	100	100	98	/	/	/
RIV	96	98	93	98	93	86	97	/	/	/
PARCHI	87	98	100	99	100	96	97	87	98	91
PORTINERIA	87	98	97	95	97	72	94	/	/	/
TAMBURI	68	81	77	81	77	80	80	/	/	/

CONCLUSIONI

Nel mese di settembre 2013, le concentrazioni di inquinanti più elevate sono state registrate nel sito *cokeria*. L'unica eccezione è costituita dal Black Carbon, che nel sito di Tamburi mostra valori maggiori rispetto alla cokeria. Questo elemento è ad oggi in fase di valutazione da parte di ARPA, che sta analizzando i possibili elementi che possono essere all'origine di tale situazione.