






















Comunicazione e informazione per migliorare lo stile di vita del consumatore pugliese, attraverso il maggiore consumo del pescato locale

Caratteristiche biologiche ed ecologia delle specie ittiche pescate in Puglia

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
|  Anguilla - <i>Anguilla anguilla</i> |  Grongo - <i>Conger conger</i> |  Murena - <i>Muraena helena</i> |  Agluglia - <i>Belone belone</i> |  Pesce sciabola - <i>Lepidopus caudatus</i> |  Leccia - <i>Lichia amia</i> |  Ricciola - <i>Seriola dumerili</i> |  Sugarello maggiore - <i>Trachurus mediterraneus</i> |  Sugarello - <i>Trachurus trachurus</i> |  Latterino - <i>Atherina boyeri</i> |
|  Garizzo o menola - <i>Spicara flexuosa</i> |  Zerzo o menola - <i>Spicara smaris</i> |  Alaccia - <i>Sardinella aurita</i> |  Sardina - <i>Sardina pilchardus</i> |  Acciuga o alice - <i>Engraulis encrasicolus</i> |  Lampuga - <i>Coryphaena hippurus</i> |  Tombarello - <i>Auxis thazard</i> |  Tonnetto alletterato - <i>Euthynnus alletteratus</i> |  Palamita - <i>Sarda sarda</i> |  Lanzardo - <i>Scomber japonicus</i> |
|  Sgombro - <i>Scomber scombrus</i> |  Tonno alalunga - <i>Thunnus alalunga</i> |  Tonno rosso - <i>Thunnus thynnus</i> |  Pesce spada - <i>Xiphias gladius</i> |  Pesce serra - <i>Pomatomus saltatrix</i> |  Spigola - <i>Dicentrarchus labrax</i> |  Cefalo dorato - <i>Chelon auratus</i> |  Cefalo bosega - <i>Chelon labrosus</i> |  Cefalo calamita - <i>Chelon ramada</i> |  Muggine - <i>Mugil cephalus</i> |
|  Boga - <i>Boops boops</i> |  Dentice - <i>Dentex dentex</i> |  Sarago sparaglione - <i>Diplodus annularis</i> |  Sarago pizzuto - <i>Diplodus puntazzo</i> |  Sarago maggiore - <i>Diplodus sargus</i> |  Sarago fasciato - <i>Diplodus vulgaris</i> |  Mormora - <i>Lithognathus mormyrus</i> |  Occhiata - <i>Oblada melanura</i> |  Pagello bastardo - <i>Pagellus acarne</i> |  Pagello occhione - <i>Pagellus bogaraveo</i> |
|  Pagello fragolino - <i>Pagellus erythrinus</i> |  Pagro - <i>Pagrus pagrus</i> |  Salpa - <i>Sarpa salpa</i> |  Orata - <i>Sparus aurata</i> |  Tanuta - <i>Spondyliosoma cantharus</i> |  Rombo quattrocchi - <i>Lepidorhombus boscii</i> |  Rombo giallo - <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> |  Sogliola comune - <i>Solea solea</i> |  Zanchetta - <i>Arngiossua laterna</i> |  Triglia di fango - <i>Mullus barbatus</i> |
|  Triglia di scoglio - <i>Mullus surmuletus</i> |  Cappone cocchio - <i>Chelidonichthys cuculus</i> |  Cappone ubriaco - <i>Chelidonichthys lastoviza</i> |  Cappone gallinella - <i>Chelidonichthys lucerna</i> |  Cappone gorno - <i>Eutrigla gurnardus</i> |  Cappone lira - <i>Trigla lra</i> |  Budego - <i>Lophius budegassa</i> Rana pescatrice - <i>Lophius piscatorius</i> |  Potassolo - <i>Micromesistius poutassou</i> |  Merluzzetto - <i>Trisopterus minutus capelanus</i> |  Nasello - <i>Merluccius merluccius</i> |
|  Musdea o Mostella bianca - <i>Phycis blennoides</i> |  Musdea o Mostella - <i>Phycis phycis</i> |  Ombrina - <i>Umbrina cirrosa</i> |  Corvina - <i>Sciaena umbra</i> |  Cernia bianca - <i>Epinephelus aeneus</i> |  Cernia dorata - <i>Epinephelus costae</i> |  Cernia bruna - <i>Epinephelus marginatus</i> |  Perchia - <i>Serranus cabrilla</i> |  Sciarrano - <i>Serranus scriba</i> |  Scorfano rosa - <i>Scorpaena elongata</i> |
|  Scorfano nero - <i>Scorpaena porcus</i> |  Scorfano rosso - <i>Scorpaena scrofa</i> |  Scorfano di fondale - <i>Helicolenus dactylopterus</i> |  Tracina drago - <i>Trachinus draco</i> |  Pesce prete - <i>Uranoscopus scaber</i> |  Pesce San Pietro - <i>Zeus faber</i> |  Verdesca - <i>Prionace glauca</i> |  Palombo - <i>Mustelus mustelus</i> |  Spinarolo - <i>Squalus acanthias</i> |  Gattuccio - <i>Scyllorhinus canicula</i> |
|  Razza chiodata - <i>Raja clavata</i> |  Totano - <i>Illex coindetii</i> |  Calamaro comune - <i>Loligo vulgaris</i> |  Seppia comune - <i>Sepia officinalis</i> |  Moscardino bianco - <i>Eledone cirrhosa</i> |  Moscardino muschiato - <i>Eledone moschata</i> |  Polpo comune - <i>Octopus vulgaris</i> |  Lumachino - <i>Nassarius mutabilis</i> |  Murice spinoso - <i>Bolinus brandaris</i> |  Murice troncato - <i>Hexaplex trunculus</i> |
|  Mussolo o Piede di Capra - <i>Arca noae</i> |  Cuore rosso - <i>Acanthocardia tuberculata</i> |  Arsella troncata o Tellina - <i>Donax trunculus</i> |  Fasolaro - <i>Callista chione</i> |  Vongola o Lupino - <i>Chamelea gallina</i> |  Vongola verace - <i>Ruditapes decussatus</i> |  Vongola giapponese - <i>Ruditapes philippinarum</i> |  Tartufo o noce - <i>Venus verrucosa</i> |  Mitilo comune o Cozza - <i>Mytilus galloprovincialis</i> |  Cozza pelosa - <i>Modiolus barbatus</i> |
|  Ostrica giapponese o concava - <i>Magallana gigas</i> |  Ostrica piatta - <i>Ostrea edulis</i> |  Pettine comune o Canestrello - <i>Aequipecten opercularis</i> |  Cappasanta - <i>Pecten jacobaeus</i> |  Cannolicchio curvo - <i>Ensis ensis</i> |  Cannolicchio violaceo - <i>Ensis minor</i> |  Cannolicchio scanalato - <i>Solen marginatus</i> |  Gambero rosso - <i>Aristaomorpha foliacea</i> |  Gambero viola - <i>Aristeus antennatus</i> |  Mazzancolla - <i>Melicertus kerathurus</i> |
|  Gambero bianco - <i>Parapenaeus longirostris</i> |  Aragosta mediterranea - <i>Palinurus elephas</i> |  Astice - <i>Homarus gammarus</i> |  Scampo - <i>Nephrops norvegicus</i> |  Canocchia - <i>Squilla mantis</i> | a cura di : N. Ungaro; C.G. Giannuzzi; B. Casale; M. Sguera | | | | |

inquadra il qr-code per visualizzare le caratteristiche biologiche e l'ecologia delle singole specie ittiche.